



عنوان طرح تحقیقاتی:

بررسی اطلاعات اپیدمیولوژیک و دموگرافیک اقدام کنندگان به خودکشی در شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بم: ۱۴۰۱-۱۳۹۵

تاریخ خاتمه طرح: ۱۴۰۴/۱۰/۱۰

مجری یا محقق اصلی و همکاران با ذکر وابستگی هر فرد:

مجری اصلی: سمانه نعمت الهی، مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی بم، بم، ایران

همکاران

محمد بنی اسدی، استادیار آمار زیستی و بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بم، بم، ایران

علیرضا مقدمی، دکتری عمومی، دانشگاه علوم پزشکی بم، بم، ایران

الهام عیسانی، میکروب شناسی (دکترای باکتری شناسی)، دانشگاه علوم پزشکی بم، بم، ایران

زینب سرحدی، روانشناسی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی بم، بم، ایران

علی صدیقی، استادیار دکتری تخصصی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بم، بم، ایران

عنوان پیام پژوهشی (حداکثر ۲۰ کلمه):

اطلاعات اپیدمیولوژیک و دموگرافیک اقدام کنندگان به خودکشی در شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بررسی شد.

پیام کلیدی (حداکثر ۸۰ کلمه):

طبق نتایج مطالعه ما نرخ خودکشی در شهرستانهای بم و فهرج قبل از سال ۱۳۹۹ روند کاهشی و بعد از سال ۱۳۹۹ روند افزایشی دارد، اما در شهرستان نرماشیر در طول سالهای مورد مطالعه نرخ خودکشی روند افزایشی دارد و در شهرستان ریگان بعد از سال ۱۳۹۷ نرخ خودکشی روند کاهشی دارد.

متن پیام پژوهشی (حداکثر ۲۴۰ کلمه):

• اهمیت موضوع (۵۰ کلمه)،

در سالهای اخیر شاهدیم که جامعه بین المللی به صورت فزاینده ای به گستره، وسعت و همچنین مسئولیت های خود در مورد پدیده خودکشی توجه می نماید. وقوع خودکشی در سال های اخیر به گونه ای افزایش یافته است که نه تنها نگرانی های ملی، بلکه جهانی را نیز برانگیخته است.

تهیه کننده:

تاریخ تهیه:

۱۴۰۲/۰۸/۳

گروه کاربست نتایج تحقیقات



- مهم ترین نتایج طرح به زبان غیر تخصصی (حداکثر ۷۰ کلمه)
- خودکشی موفق در مردان به طور معناداری نسبت به زنان بیشتر می باشد.
- درصد بالایی از اقدام کنندگان به خودکشی در مناطق شهری زندگی می کنند.
- درصد بالایی از خودکشی های موفق مربوط به روش حلق آویز می باشد.
- درصد بالایی از افراد از مسمومیت برای اقدام به خودکشی استفاده کرده اند.
- استفاده از حلق آویز و استفاده از سلاح گرم در مردان نسبت به زنان و مسمومیت و خودسوزی در زنان نسبت به مردان معمول تر است.

• موارد کاربرد نتایج طرح (۸۰ کلمه)

در این مطالعه که به صورت توصیفی انجام شد، به محاسبه نرخ خودکشی در سالهای مختلف، شهرستانهای مختلف، گروههای جنسی و گروههای سنی پرداخته شد. همچنین روند تغییرات نرخ خودکشی در طول زمان نیز بررسی شد. در این مطالعه با توجه به اینکه داده ها با همکاری گروه سلامت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بم گردآوری شد نتایج مستخرج از طرح به این معاونت ارائه گردید تا در صورت صلاحدید مداخلات لازم انجام شود.

تأثیرات و کاربردها:

- **تأثیر ۱:** نتایج مستخرج از طرح به گروه سلامت روان معاونت بهداشتی ارائه گردید تا در صورت صلاحدید مداخلات لازم انجام شود.
- **تأثیر ۲:** نتایج توسط نشست خبری در اختیار رسانه های دانشگاه قرار گرفت تا شاهد تاثیر افزایش آگاهی عموم و خانواده ها و ارتقای سلامت روان اقدام کنندگان به خودکشی باشیم.

محدودیت های شواهد چه بودند؟

محدودیت خاصی وجود نداشت.

مخاطبان طرح پژوهشی:

عموم مردم شهرستان های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی بم

آیا این خبر می تواند از نظر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، بهداشتی، ارزش های دینی و قوانین سازمان غذا و دارو، تبعاتی داشته باشد؟ خیر



در صورتی که این طرح منتج به مقاله شده است لینک مقاله درج شود:

<https://clinical-practice-and-epidemiology-in-mental-health.com/VOLUME/21/ELOCATOR/e17450179398446/FULLTEXT/>

ایمیل ارتباطی و تلفن مجری اصلی طرح:

samane.nematolahi@yahoo.com

09171079152

منابع و مراجع : حداکثر چهار مرجع اصلی استفاده شده در طرح تحقیقاتی مورد نظر را ذکر نمایید

1. WHO. Suicide worldwide in 2019: global health estimates. Geneva: World Health. Organization, 2021.
2. Murray BL WK. Integration of a suicide risk assessment and intervention approach: the perspective of youth. 2006;13(2):157-64. J Psychiatr Ment Health Nurs. 2006.
3. WHO. Suicide worldwide in 2019: global health estimates. Geneva: World Health Organization, 2021.
4. Memari AM RT, Amirmoradi F, Khosravi KH, Godarzi Z. Causes of suicide in married women. 2006;12(1):47-53. Hayat. 2006.