

عنوان طرح تحقیقاتی: بررسی شیوع و علل سقط عمدی در ایران: مطالعه مرور سیستماتیک

تاریخ خاتمه طرح: ۱۴۰۴/۳/۱۷

مجری یا محقق اصلی و همکاران با ذکر وابستگی هر فرد:

۱. لیلی عابدی قشلاقی - دانشگاه علوم پزشکی بم
۲. مریم چگنی - دانشگاه علوم پزشکی خمین
۳. ناهید باقری - دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۴. مریم عظیم زاده - دانشگاه علوم پزشکی خمین
۵. فاطمه محسن بیگی - دانشگاه علوم پزشکی بم

عنوان پیام پژوهشی (حداکثر ۲۰ کلمه):

شیوع سقط عمدی و علل موثر بر آن در ایران

پیام کلیدی (حداکثر ۸۰ کلمه):

- ✓ شیوع سقط جنین عمدی در ایران ۱۸,۱٪ بود.
- ✓ مناطق مرکزی ایران (۲۷,۴٪) بالاترین شیوع سقط جنین عمدی را داشتند .
- ✓ وضعیت دشوار اقتصادی، تعداد کافی فرزندان زنده قبلی، سطح پایین تحصیلات، تحصیلات دانشگاهی، والدین جوان‌تر، مادر شاغل، باورهای مذهبی و آگاهی کم در مورد استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری از دلایل سقط جنین عمدی بودند.

متن پیام پژوهشی (حداکثر ۲۴۰ کلمه):

شیوع سقط جنین عمدی ۱۸٪ بود و مناطق مرکزی ایران شامل استان های تهران و اصفهان بالاترین شیوع را گزارش کردند که برای یک کشور مذهبی نرخ بالایی را نشان می دهد. دلایل سقط جنین عمدی شامل وضعیت دشوار اقتصادی، تعداد کافی فرزندان زنده قبلی، سطح پایین تحصیلات، تحصیلات دانشگاهی، والدین جوان تر، مادر شاغل، باورهای مذهبی و آگاهی کم در مورد استفاده از روش های پیشگیری از بارداری بود.

• اهمیت موضوع (۵۰ کلمه)،

سقط جنین یکی از مشکلات عمده سلامت عمومی زنان در دوران بارداری است و به عنوان سومین علت مرگ و میر در بسیاری از جوامع مانند ایران شناخته می شود. به همین منظور، این مرور سیستماتیک با هدف برآورد شیوع سقط جنین القایی و علل آن در ایران انجام شد.

• موارد کاربرد نتایج طرح (۸۰ کلمه)

تأثیرات و کاربردها:

یافته های مطالعه حاضر، شواهد مهمی را برای سیاست گذاری و برنامه ریزی سلامت بهره وری ارائه می دهد. از آنجایی که سقط جنین عمدی یک مشکل بهداشتی در بین زنان در سن جنسی است، سیاست گذاران باید خدمات بهداشت جنسی و باروری گسترده و مؤثری را برای زنان فراهم کنند. برنامه هایی برای آموزش و معیشت زنان باید تنظیم شود تا به آنها در انتخاب های آگاهانه، مانند استفاده از روش های پیشگیری از بارداری و جلوگیری از بارداری های ناخواسته، کمک کند.

محدودیت های شواهد چه بودند؟

فقدان اطلاعات دقیق در مورد نوع روش های سقط جنین (مثلاً جراحی، پزشکی یا سنتی) و محیط هایی که این روش ها در آنها انجام شده است (مثلاً بیمارستان، درمانگاه یا خانه) در اکثر مطالعات مورد بررسی قرار نگرفته است. این فقدان جزئیات، مانع از درک جامع از ایمنی و وضعیت قانونی شیوه های سقط جنین در ایران می شود.

مخاطبان طرح پژوهشی:

متخصصین و پژوهشگران: سیاست گذاران بهداشتی، زنان در سن جنسی

آیا این خبر می تواند از نظر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، بهداشتی، ارزش های دینی و قوانین سازمان غذا و دارو، تبعاتی داشته باشد؟ خیر

بهداشتی:

تهیه کننده:

تاریخ تهیه:

۱۴۰۳/۰۸/۳

گروه کاربست نتایج تحقیقات

در صورتی که این طرح منتج به مقاله شده است لینک مقاله درج شود:

ایمیل ارتباطی و تلفن مجری اصلی طرح:

Abedi.leili@gmail.com

09144356427

منابع و مراجع : حداکثر چهار مرجع اصلی استفاده شده در طرح تحقیقاتی مورد نظر را ذکر نمایید

1. Erfani A. Levels, Trends and Correlates of Abortion in Tehran, Iran: 2009-2014. Int Perspect Sex Reprod Health. 2016;42(2):93–101.
2. Nikpour B, Majlesi F, Tal A, Eshraghi N. Assessment of Induced Abortions and its Effective Factors in Comparison with Spontaneous Abortions among Women Refer to Hospitals in South of Tehran. Quarterly Journal of Health Breeze. 2013;1(3):14–20.
3. Aghdam NG, Khosravi Z, Tavoli A, Tehrani FR, Nazarpour S. The comparison of anxiety and depression in women with the experience of induced abortion and delivery of unwanted pregnancy. Med J Tabriz Univ Med Sci. 2022;44(4):305–16.
4. Mirzamoradi M, Saleh M, Jamali M, Bakhtiyari M, Pooransari P, Saleh Gargari S. Factors related to unwanted pregnancies and abortion in the northern district of the city of Tehran, Iran. Women Health. 2018;58(6):714–28.